## 社会福祉法人 常真会 田島保育園

クラス	
児童名	

病名

年 月 日 から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので、 登園可能と判断いたします。

\_\_\_\_\_年 月 日

医療機関

医師名

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行を出来るだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮下さい。

## 〇医師の記入した意見書が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻しん(はしか)	発症1日前から発しん出現後の 4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状が有る期間(発症前24時間 から発症後3日程度までが最も 感染力が強い)	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日 を経過するまで( <b>幼児(乳幼児)にあっては</b> <b>3日を経過するまで</b> )
風しん	発しん出現の前7日から後7日間 くらい	発しんが消失してから
水痘(水ぼうそう)	発しん出現1~2日前から痴皮形成まで	全ての発しんが痴皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふく風邪)	発症3日前から耳下腺針脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫腸が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜炎 (プール熱)	発熱、充血等症状が出現した 数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した 数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が 消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまでまたは、5日間の 適正な抗菌物質製剤による治療を終了す るまで
陽管出血性大腸菌 感染症		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が 終了し、48時間をあけて連続2回の検便に
(O157、O26、O111等)		よって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週間 便から数週間~数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで